



# Les dents de mon enfant, de 0 à 12 ans

Quand elles poussent, comment les brosser, comment reconnaître une dent de lait, et que faire s'il a mal

## Quand les dents poussent-elles ?

Chaque enfant a son rythme : plusieurs mois d'écart avec le tableau, c'est normal. Ce qui compte, c'est l'ordre.

| Dents de lait (20)  | Pousse       | Tombe       |
|---------------------|--------------|-------------|
| Incisives centrales | 6 – 12 mois  | 6 – 7 ans   |
| Incisives latérales | 9 – 16 mois  | 7 – 8 ans   |
| Canines             | 16 – 23 mois | 9 – 12 ans  |
| 1res molaires       | 13 – 19 mois | 9 – 11 ans  |
| 2es molaires        | 23 – 33 mois | 10 – 12 ans |

| Dents définitives (28 + 4)                                                 | Pousse      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1res molaires « de 6 ans » – derrière les dents de lait, sans en remplacer | 6 – 7 ans   |
| Incisives                                                                  | 6 – 9 ans   |
| Canines et prémolaires                                                     | 9 – 13 ans  |
| 2es molaires « de 12 ans »                                                 | 11 – 13 ans |
| Dents de sagesse                                                           | 17 – 25 ans |

### Les poussées dentaires

Gencive gonflée, joues rouges, salive, envie de mordiller : classique. Anneau de dentition réfrigéré et massage doux de la gencive. Une forte fièvre ne vient pas des dents : consultez le médecin.

## Dent de lait ou dent définitive ?



### La couleur

Lait : blanc laiteux. Définitive : plus ivoire. À côté d'une dent de lait, elle paraît « sale » : normal.



### La taille et le bord

Les définitives sont bien plus grandes ; les incisives neuves ont trois petites bosses sur le bord (« mamelons »), les dents de lait un bord lisse.



### Le piège : la dent de 6 ans

La première molaire définitive pousse tout au fond, sans qu'aucune dent ne tombe. Elle est définitive : protégez-la.

## Le brossage, âge par âge



### Dès la première dent

#### LE PARENT Brosse

**Matériel** : brosse bébé à petite tête et poils souples ; dentifrice fluoré 1000 ppm, une trace de la taille d'un grain de riz

**Rythme** : 2 fois par jour, surtout le soir. Ensuite, plus rien d'autre que de l'eau



**cabinet  
dentaire**  
CHARNAY-LÈS-MÂCON



### 3 – 6 ans

#### L'ENFANT COMMENCE, LE PARENT TERMINE

**Matériel** · petite brosse souple ; dentifrice fluoré 1000 ppm, la taille d'un petit pois. Apprendre à cracher sans rincer

**Rythme** · 2 fois par jour, 2 minutes – un sablier ou une chanson aide. La technique : brosse inclinée vers la gencive, petits mouvements « du rose vers le blanc », extérieur, intérieur, dessus



### 6 ans et plus

#### SOUS CONTRÔLE, PUIS SEUL VERS 8 – 10 ANS

**Matériel** · brosse souple ou électrique enfant, puis brosse adulte ; dentifrice 1000 à 1450 ppm, puis 1450 ppm ; fil ou brossettes le soir dès que les dents se touchent

**Rythme** · 2 fois par jour, 2 minutes ; il n'est vraiment autonome que lorsqu'il sait écrire en attaché : vérifiez le soir. Brosse changée tous les 3 mois

## Prévenir les caries



#### Pas de biberon sucré au lit

Lait, jus, sirop pour s'endormir : c'est la cause n° 1 des caries du tout-petit. Le soir, après le brossage, de l'eau seulement.



#### Le sucré aux repas, l'eau entre

Sodas, jus, sirops, bonbons et grignotage en continu : la carie assurée. Aux repas seulement.



#### Le scellement des sillons

Vers 6 ans et 12 ans, une fine résine protège les creux des molaires définitives, là où la brosse n'entre pas. Remboursé jusqu'à 16 ans.



#### Une visite par an

Et chaque année, de 3 à 24 ans, l'examen M'T dents pris en charge à 100 %.

## Il a mal, ou il est tombé



### Une tache, un trou, une sensibilité

#### PRENEZ RENDEZ-VOUS

**Ce que vous sentez** · tache blanche ou brune, trou, dent sensible au sucré ou au froid

**C'est probablement** · une carie – même sur une dent de lait, il faut la soigner : elle peut faire mal, s'infecter et abîmer la dent définitive dessous

**Que faire** · pas d'urgence, mais un rendez-vous dans les semaines qui viennent, à prendre en ligne. En attendant : brossage soigneux, éviter le sucré, paracétamol à la dose du carnet de santé. Jamais d'aspirine, jamais rien posé sur la dent.



### Joue gonflée, fièvre, ou une chute

#### CONSULTEZ VITE

**Ce que vous sentez** · gonflement, fièvre, douleur qui l'empêche de dormir ; ou après une chute : dent cassée, qui bouge, enfoncée, qui change de couleur

**C'est probablement** · un abcès, ou un traumatisme dentaire

**Que faire** · c'est le seul cas où il faut consulter le jour même (le 15 le soir ou le week-end). Une **dent définitive expulsée** se garde dans du lait et se réimplante dans l'heure ; une **dent de lait expulsée** ne se réimplante pas, mais on vérifie que rien n'est resté dans la gencive.

Conseils donnés à titre d'information ; ils ne remplacent pas l'avis de votre chirurgien-dentiste.



**cabinet  
dentaire**  
CHARNAY-LÈS-MÂCON